

IL TRATTAMENTO AMINOACIDICO NEL FALLIMENTO DEL PALLONCINO INTRAGASTRICO



Dettagli

Categoria: PERCORSI NUTRIZIONALI

S. Barrucco

Medico Chirurgo

M. Marchetti

Farmacista e Medico Chirurgo

M. Marchetti

Farmacologo, Professore a Contratto C.D.L. Farmacia Università, Tor Vergata, Roma

INTRODUZIONE, OBIETTIVI SPECIFICI, SCOPO DELLO STUDIO

L'obiettivo è dimostrare l'efficacia del trattamento aminoacidico delle adiposità localizzate in pazienti con storia recente di fallimento nel calo ponderale in seguito ad inserimento di palloncino intragastrico

MATERIALI E METODI

Pazienti coinvolti 10

Criteri di inclusione: età tra 20 e 50 anni ambo sessi, BMI>30, con palloncino in sede da almeno 4 mesi oppure palloncino rimosso dalla sede intragastrica da non più di 2 mesi con risultati non significativi di calo ponderale (<2%).

Criteri di esclusione: insufficienza renale o epatica, gravidanza e allattamento

Ogni ciclo di trattamento aminoacidico della durata di 10 giorni veniva intervallato da una dieta di mantenimento di 14 giorni per un numero medio di cicli di 3,4

I controlli venivano eseguiti ad ogni fine ciclo

Kit impiegato: integratore alimentare a base di proteine del latte con aggiunta di isoleucina, ornitina chetoglutarato, triptofano, taurina, citrullina, citrato di potassio.

Metodi di misurazione ed analisi : pesata

RISULTATI

I risultati hanno portato ad una riduzione del peso corporeo in media del 7,3% per ogni ciclo eseguito.

CONCLUSIONI

Il trattamento aminoacidico si è rilevato essere una valida opportunità nei casi di fallimento del palloncino intragastrico, già provenienti da insuccesso dietoterapico.

KEYWORDS

dieta, peso corporeo, aminoacidi, palloncino

PRINCIPIO/MOLECOLA/TECNOLOGIA

Aminoacidi

NOME COMMERCIALE

Macresces